

## Boletín diario de situación de Influenza A ( H1 N1)

Fecha: 08/06/2009

Hora: 11 Hs

PAG. 1

### I. Vigilancia de la Morbilidad y mortalidad

El día de la fecha se notifica un nuevo caso sospechoso, procedente de Argentina. Los 5 casos sospechosos con fecha de inicio de síntomas en junio, son todos procedentes de Argentina (BsAs) sin relación entre si ni nexos con los otros conglomerados en estudio cuyos contactos no desarrollaron signos ni síntomas de IRAs (10 días de seguimiento). Se aguardan resultados de laboratorio.

Respecto al operativo de control para el evento deportivo del sábado 6 de junio pasado. El sistema de vigilancia de la XV RS registro el ingreso de 7 vehículos particulares y solo tres autobuses de turismo internacional con personas procedentes de Chile (200 personas). Por vía aérea, ingresaron hasta el día viernes 287 personas, de acuerdo a reportes de la Dirección de Migraciones del Ministerio del Interior. No se registraron sintomáticos en los hoteles. El contingente de visitantes volvió a su país de origen el día domingo 7 próximo pasado.

Se ha registrado un incremento de notificación de influenza A estacional a partir de pacientes que consultan preferentemente en el sector privado. Se recuerda que el Ministerio de Salud solo proveerá Oseltamivir a los casos sospechosos de influenza A por el nuevo subtipo para el control de brotes o en casos con riesgo de complicación y/o muerte. Se insta a los médicos del sector privado a optimizar la utilización del Oseltamivir de acuerdo a las recomendaciones del Ministerio de Salud (personas con riesgo de complicación y/o muerte) para disminuir el riesgo de generación de resistencia a la droga.

#### Vigilancia de Influenza A (H1N1), 30/04/09 al 4/06/09

Procedencia	Ingresos al País	Monitoreados al llamado telefónico	%
EEUU	1321	847	64,12
México	103	58	56,31
Panamá	62	41	66,13
Japón	71	23	32,39
Chile	328	168	51,22
Canadá	77	48	62,34
Argentina	595	315	52,94
<b>Total</b>	<b>2557</b>	<b>1500</b>	<b>58,66</b>

Fuente: Sal de Situación/Operaciones de Campo

**Definición de Caso Sospechoso (OMS):** Enfermedad febril respiratoria aguda (fiebre  $>38^{\circ}\text{C}$ ) con un espectro que va desde Enfermedad tipo Influenza (ETI) hasta Neumonía y que presenta nexo epidemiológico con un país o área afectada con transmisión humano a humano del nuevo subtipo viral.

**Enfermedad Tipo Influenza (ETI):** Fiebre súbita mayor de  $38^{\circ}\text{C}$  y tos o dolor de garganta en ausencia de otros diagnósticos.

**Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG): (Protocolo genérico):** Paciente de cualquier edad con historia de aparición súbita de fiebre mayor de  $38^{\circ}\text{C}$  y tos o dolor de garganta, disnea o dificultad para respirar y necesidad de hospitalización.

**Boletín diario de situación de Influenza A ( H1 N1)**

Fecha: 08/06/2009


Hora: 11 Hs

PAG. 2

Totales acumulados desde el 30 de Abril Paraguay 2009

Sospechosos	Descartados	Confirmados
21	5	5

Gráfico 1



Fuente: Sala de Situación

**III. Situación actual Internacional**

A la fecha, 73 países confirmaron oficialmente 25.288 casos de Influenza A (H1N1), con un total de 139 defunciones, Tasa global de letalidad= 0,5%

## Boletín diario de situación de Influenza A ( H1 N1)

Fecha: 08/06/2009

Hora: 11 Hs

PAG. 3

**Tabla 1: Casos de Influenza A ( H1N1) confirmados al 8 de Junio de 2009**

País	Total de casos	Fallecidos	Nuevos casos confirmados luego del último reporte	Fallecidos
Argentina	202	0	55	0
Australia	1051	0	175	0
Austria	5	0	3	0
Bahamas	1	0	0	0
Bahrain	1	0	0	0
Barbados	2	0	1	0
Belgium	14	0	1	0
Bolivia	3	0	0	0
Brazil	35	0	7	0
Bulgaria	2	0	1	0
Canada	2115	3	320	0
Cayman Islands, UKOT	1	0	1	0
Chile	411	1	42	0
China	108	0	19	0
Colombia	25	0	1	0
Costa Rica	68	1	0	0
Cuba	5	0	1	0
Cyprus	1	0	0	0
Czech Republic	2	0	0	0
Denmark	7	0	3	0
Dominica	1	0	1	0
Dominican Republic	44	1	11	1
Ecuador	60	0	17	0
Egypt	1	0	0	0
El Salvador	69	0	20	0
Estonia	3	0	0	0
Finland	4	0	0	0
France	58	0	11	0
Germany	63	0	20	0
Greece	5	0	0	0
Guatemala	30	0	7	0
Honduras	34	0	0	0
Hungary	3	0	0	0
Iceland	1	0	0	0
India	4	0	0	0
Ireland	11	0	3	0
Israel	54	0	15	0
Italy	50	0	12	0
Jamaica	4	0	2	0
Japan	410	0	0	0

## Boletín diario de situación de Influenza A ( H1 N1)

Fecha: 08/06/2009

Hora: 11 Hs

PAG. 4

Korea, Republic of	47	0	6	0
Kuwait	18	0	0	0
Lebanon	3	0	0	0
Luxembourg	1	0	0	0
Malaysia	5	0	3	0
Mexico	5717	106	154	3
Netherlands	10	0	6	0
New Zealand	14	0	3	0
Nicaragua	18	0	13	0
Norway	9	0	0	0
Panama	179	0	6	0
Paraguay	5	0	0	0
Peru	61	0	14	0
Philippines	33	0	4	0
Poland	5	0	1	0
Portugal	2	0	0	0
Romania	9	0	1	0
Russia	3	0	0	0
Saudi Arabia	1	0	0	0
Singapore	15	0	3	0
Slovakia	3	0	0	0
Spain	291	0	73	0
Sweden	14	0	1	0
Switzerland	16	0	6	0
Thailand	8	0	0	0
Trinidad and Tobago	2	0	2	0
Turkey	10	0	2	0
United Arab Emirates	1	0	1	0
United Kingdom	557	0	129	0
United States of America	13217	27	2163	10
Uruguay	17	0	2	0
Venezuela	4	0	0	0
Viet Nam	9	0	6	0
<b>Total</b>	<b>25288</b>	<b>139</b>	<b>3348</b>	<b>14</b>

Fuente: OMS

## II. Situación actual de Países Limítrofes

## Boletín diario de situación de Influenza A ( H1 N1)

Fecha: 08/06/2009

Hora: 11 Hs

PAG. 5

### Totales acumulados al 8 de Junio de 2009

País	Confirmados	Descartados	En estudio	Autóctonos	Importados
Argentina	202	669	886	*	*
Brasil	35	*	*	*	*
Chile	890	*	*	*	*
Uruguay	24	*	*	*	*
Bolivia	3	0	98	*	3

\* Datos aún no actualizados por la fuente

Fuente: Ministerio de Salud de cada País

### III. Promoción v Comunicación

**Es importante recordar que las siguientes medidas generales pueden ser más importantes que el uso de la mascarilla o tapaboca para prevenir la propagación de la gripe.**

#### Para las personas sanas:

Fomente que haya una distancia mínima (al menos 1 metro) en torno a cualquier persona con síntomas de tipo gripal:

- evite las aglomeraciones;
- procure no tocarse la boca ni la nariz;
- lavarse las manos con frecuencia, bien sea con agua y jabón o usando un desinfectante para las manos a base de alcohol, especialmente si se ha tocado la boca y la nariz o si ha tocado superficies que puedan estar contaminadas;
- reduzca al mínimo el tiempo que pasa en estrecho contacto con personas que puedan estar enfermas;
- pase el menor tiempo posible en sitios donde haya aglomeración;
- mejore la circulación del aire en su vivienda abriendo las ventanas cuanto sea posible.

#### Para las personas con síntomas de tipo gripal:

- quédese en casa si se siente indispuesto y siga las recomendaciones locales de salud pública;
  - guarde la distancia mínima (al menos 1 metro) con respecto a las personas sanas;
  - cúbrase la boca y la nariz al toser o estornudar, ya sea con un pañuelo desechable u otro material apropiado, para contener las secreciones respiratorias. Deseche el material inmediatamente después de usarlo o lávelo. Lávese las manos inmediatamente después del contacto con secreciones respiratorias
  - mejore la circulación del aire en su vivienda abriendo las ventanas cuanto sea posible.
- Si se opta por la mascarilla, es imprescindible usarla y desecharla correctamente para lograr que sea lo eficaz que pueda ser e impedir que aumente el riesgo de transmisión por usarla incorrectamente.

## Boletín diario de situación de Influenza A ( H1 N1)

Fecha: 08/06/2009

Hora: 11 Hs

PAG. 6

**La siguiente información sobre el uso correcto de la mascarilla o tapaboca está basada en las prácticas que se aplican en los centros de atención de salud:**

- Póngase la mascarilla o tapaboca cuidadosamente de modo que esta cubra la boca y la nariz, y ajústela ceñidamente para que no haya huecos entre la cara y la mascarilla o tapaboca.
- Procure no tocar la mascarilla o tapaboca mientras la lleva puesta – siempre que toque una mascarilla o tapaboca, por ejemplo, al quitársela o lavarla, lávese las manos con agua y jabón o usando un desinfectante para las manos a base de alcohol
- Tan pronto como la mascarilla o tapaboca se humedezca, cámbiela por otra que esté limpia y seca
- No vuelva a usar las mascarilla desechables o tapaboca – deseche las mascarillas desechables o tapaboca después de usarlas una sola vez y elimínelas en seguida.

Aunque a menudo se emplean mascarillas o tapaboca distintos de las que usa el personal sanitario (por ejemplo, mascarillas de tela, bufandas, mascarillas de papel o trapos atados sobre la nariz y la boca), no hay información suficiente que avale su eficacia. Dichas mascarillas alternativas solo deben usarse una vez o, si son de tela, limpiarse a fondo entre cada uso (es decir, lavándolas con un detergente doméstico corriente a temperatura normal). Se deben retirar inmediatamente después de atender a un enfermo. Hay que lavarse las manos inmediatamente después de quitarse la mascarilla.

Fuente: CDC

### V. Recomendaciones Permanentes

#### A Los trabajadores en caso de Pandemia

- Usar lugares alternativos para evaluar síntomas de gripe o implementar sistemas de seguimiento telefónico.
- Aislar pacientes tan pronto se pueda.
- Restringir a sólo un cuidador por paciente.
- Recomendar tanto al enfermo como al cuidador el uso de tapabocas.
- Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón.
- Lavar la indumentaria médica en el establecimiento.

#### A los viajeros

- Prestar mucha atención a la salud durante los 14 días siguientes al retorno.
- Si se presentan alguno de los siguientes síntomas:
  - ✚ a. Fiebre
  - ✚ b. Tos
  - ✚ c. Dolor de garganta
  - ✚ d. Dolores musculares y articulares
  - ✚ e. Cefalea
- Contactar con el centro de salud más cercano o al servicio de urgencias.
- En ese contacto, informar sobre el viaje a zona afectada y la fecha de regreso.
- No ir al trabajo, la escuela ni viajar si se encuentra con síntomas de gripe.

***Cuando cuide de un familiar que esté enfermo de influenza en el hogar, las principales medidas de protección para usted y las demás personas que no están enfermas son:***

## Boletín diario de situación de Influenza A ( H1 N1)

Fecha: 08/06/2009

Hora: 11 Hs

PAG. 7

- Recordar a la persona enferma que se cubra la boca cuando tose y que se lave a menudo las manos con agua y jabón o con una loción para manos a base de alcohol, especialmente después de toser o estornudar.
- Hacer que todos los miembros del hogar se laven a menudo las manos con agua y jabón o frotándose con una loción para manos a base de alcohol.
- Consultar con el profesional médico si las personas que viven con un enfermo de influenza, particularmente las que tengan afecciones crónicas, deben tomar medicamentos antivirales como oseltamivir para prevenir contraer la influenza.

### *Dónde debe permanecer una persona enferma en la casa*

- Mantenga a la persona enferma en una habitación separada de las áreas comunes de la casa. (Por ejemplo, una habitación aparte que tenga su propio baño, si es posible.) Mantenga cerrada la habitación del enfermo.
- A menos que tenga que ir al médico, una persona con influenza no debe salir de la casa cuando tenga fiebre y hasta 7 días después de que aparecen los síntomas en los adultos, y 10 días después de que aparecen los síntomas en los niños).
- Haga que la persona use una mascarilla si tiene que estar en áreas comunes de la casa o cerca de otras personas.
- De ser posible, la persona enferma debe usar un baño aparte, o el baño debe mantenerse limpio periódicamente.

### VI. Fuentes de Información

- LCSP.
- DIVET
- OPS/OMS

### VII. Canales de información

Líneas gratuitas:

0800 110 800 Lunes a Viernes de 7 a 15 hs

141 SEME : 24 horas

E-mail : [dgvs\\_cne@mspbs.gov.py](mailto:dgvs_cne@mspbs.gov.py)

### Datos importantes sobre la influenza A/H1N1

<http://www.mspbs.gov.py>

<http://www.who.int/es/>

<http://www.oie.int/eng/press/en>